

聚焦公立医院高质量发展



济宁市第一人民医院

微创小切口解决心脏大难题

■通讯员 魏震 乔萌

心脏，是生命的引擎；健康，是幸福的基石。当冠心病威胁生命时，传统的开胸搭桥手术虽能救命，但创伤大、恢复慢的难题让许多患者望而却步。如今，随着医学技术的革新，心外科微创小切口搭桥术（MIDCAB）应运而生。它以更小的创伤、更快的康复、更精准的治疗，为心脏病患者带来焕然一“心”的生机。截至目前，济宁市第一人民医院心外科已成功开展2例微创搭桥手术，患者术后恢复良好，生活质量显著提升。一位74岁的男性患者因严重冠心病导致反复心绞痛，但因恐惧开胸手术，一度拒绝治疗。在该院实施微创小切口搭桥术后，第二天患者即可坐起，不到一周就能步行出院。如今，他重拾

活力人生：“没想到这么个小切口，就解决了大问题！”


微创小切口搭桥术（MIDCAB）是国际领先的心脏外科技术，通过仅5-10厘米的侧胸小切口，在胸腔镜辅助或机器人技术支持下，精准完成冠状动脉血管的“桥梁搭建”，恢复心脏血流。无需开胸，最大限度减少手术创伤，是冠心病患者的精准治疗的新选择。

济宁市第一人民医院心脏大血管外科吴联合教授团队，在张申主任带领下，多年来致力于心外科新技术的引进与应用，团队率先开展心外科微创小切口搭桥术。团队由资深心脏外科专家领衔，联合麻醉、影像、重症监护等多学科协作，配备国际一流的高清胸腔镜及术后快速康复体系，确保手术安全与效果。

▶ 健康小贴士

微创小切口搭桥术四大核心优势，让心脏康复更轻松

1. 创伤小，痛苦少。告别传统开胸手术的20厘米长切口，仅需侧胸小切口，不损伤胸骨，避免骨骼愈合风险，术后疼痛大幅减轻。
 2. 精准安全，效果可靠。借助高清胸腔镜或机器人技术，医生视野更清晰，血管吻合更精细，搭桥通畅率媲美传统手术，远期效果显著。
 3. 恢复快，住院时间短。术后1至3天即可下床活动，5至7天出院，2至4周重返正常生活，大幅缩短康复周期。
 4. 疤痕小，更美观。切口隐藏于侧胸或腋下，愈合后仅留细小疤痕，兼顾健康与美观，提升患者生活质量。
- 哪些人群适合微创搭桥？
- 单支或多支冠状动脉狭窄（前降支病变尤为适合）；高龄、体质虚弱、合并症多（如糖尿病、肺功能差）的冠心病患者；对美观要求较高或担心传统手术创伤的患者；经心内科评估需外科干预，但拒绝开胸手术者。



曲 阜

圣城儒膳进万家
杏坛百草竞风华



近日，以“圣城儒膳进万家 杏坛百草竞风华”为主题的曲阜市第二届药膳餐厅暨养生达人选拔赛成功举办，通过将儒家饮食文化与中医药膳智慧相融合，生动展现了中医生活化的曲阜实践。

活动现场，12家餐饮单位同台竞技，奉上一道道融合中医养生智慧与孔府菜精髓的创新药膳。“黄精煨海参”“茯苓八珍糕”“百合莲子羹”等兼具疗效与美味的菜品吸引众多群众驻足品鉴。

5位评委专家从药材配伍与功效、烹饪技巧与口感、观感与摆盘、营养与卫生、文化内涵与答辩等五个维度，对药膳进行了现场打分。经过激烈角逐，杨晓民等12名厨师分别获得了金牌、银牌和优秀药膳能手荣誉称号，醉如意等12家餐厅分别被评为药膳餐厅一、二、三等奖。

杨晓民表示，他把《饮膳正要》里的古方进行了现代化改良，比如在传统孔府菜“诗礼银杏”中加入陈皮，既助消化又保留文化韵味。

比赛现场特别设置了“家庭药膳工坊”“香囊DIY制作”“中医体质检测”等互动体验区，向群众展示了中药茶饮、中药手串、香牌、香薰等中药衍生产品。“曲阜市已编撰出版《孔府菜与养生保健》，正在打造‘中医养生社区示范点’，年内将培训100名家庭药膳指导员，以家庭药膳为突破口，在全市开展多种形式的中医生活化推广活动。”曲阜市卫生健康局党组书记、局长张建介绍。

据悉，本届大赛评选出的12道精品药膳将被纳入“曲阜特色养生菜单”，向全市群众及来曲游客进行推广。曲阜市将持续打造“圣城儒膳”品牌，让中医药文化真正成为群众“看得见、学得会、用得上”的生活智慧。

■通讯员 张杰 郭姝君 摄

微山县人民医院

妙手取栓让急性脑梗死患者神经功能完全恢复

本报微山讯（通讯员 焦裕如 刘仰镇）近日，微山县人民医院神经内科团队成功完成一例急性脑梗死血管内取栓术，帮助一名突发重症脑梗死的高龄患者实现功能完全恢复，不仅彰显了该院在卒中急救领域的硬核实力，也为本地区脑血管病患者带来了更优质的治疗选择。

据悉，患者为男性，79岁，于家中突发右侧肢体活动不灵、言语不清，并逐渐出

现意识不清，家属紧急拨打“120”送至微山县人民医院新院区。卒中绿色通道迅速启动，神经内科、急诊科、影像科、检验科多学科联动，快速完成病史查体、头颅CT、血液检查等初步评估，考虑为颅内大动脉闭塞、左侧颈内动脉及大脑中动脉急性闭塞。医生与患者家人沟通后，第一时间给予阿替普酶静脉溶栓。家属同意进行机械取栓治疗，神经介入团队随即给予脑血管造影，进一步证实了为左侧颈内动

脉末端闭塞，该部位闭塞会导致大脑半球2/3区域缺血梗死，死亡率高达40%，应立即给予机械取栓治疗。

介入团队采用ADAPT直接抽吸取栓方案，通过股动脉穿刺建立通路，利用最新一代大口径抽吸导管清除血栓，取出血栓4枚。术后患者转入重症监护室观察监护，病情进一步稳定后转入神经内科病房，术后1周患者出院，出院时患者神经功能完全恢复。

中国中医科学院西苑医院济宁医院

仁心施仁术“怪病”得康复

■通讯员 王碧辉 孙雪莲

去年的这个时候，38岁青年李先生被单位派往某大城市进修，原本他满怀期待，却未曾料到，一场突如其来的“怪病”悄然降临。

到达培训地没几天，李先生的前胸后背就慢慢长满了鲜红的皮疹，皮疹在太阳的照射下，更是奇痒难忍，让他痛苦不堪。紧接着，四肢开始逐渐乏力，原本简单的双臂上举、蹲下起身等动作，都变得异常艰难。在这座医疗资源丰富的城市，李先生本以为看病并非难事，然而，他辗转多家医院，却始终未能找到病因。面对日益严重的病情，患者不得不提前结束了进修之旅，返回家乡。

回到济宁后，患者怀着忐忑的心情来

到了中国中医科学院西苑医院济宁医院就诊。经过一系列的检查，一张生化化验单上密密麻麻的向上箭头，如同一个个谜团的照射下，更是奇痒难忍，让他痛苦不堪。紧接着，四肢开始逐渐乏力，原本简单的双臂上举、蹲下起身等动作，都变得异常艰难。在这座医疗资源丰富的城市，李先生本以为看病并非难事，然而，他辗转多家医院，却始终未能找到病因。面对日益严重的病情，患者不得不提前结束了进修之旅，返回家乡。

然而，脾胃病科医生在仔细研究患者的化验单后，却发现了不同寻常之处——患者的病情并不太像肝损伤，反倒是心肌酶谱里的肌酸激酶大幅度升高。经相关科室会诊后，风湿病科主任孔祥民给出了斩钉截铁的诊断：“这就是皮炎炎。”

在患者转入了风湿病科病房后，孔祥民带着科室的医护人员，为患者精心制定了一套中西医结合的治疗方案。这个方案既包含了中医中药的辨证论治，也融合了

免疫抑制剂和激素等现代医学手段。奇迹在两天后便悄然显现——患者的皮疹开始逐渐消退，四肢的力量也逐渐恢复。经过近两周的住院治疗，在出院前的复查中，患者的肌酸激酶已经下降了一大半，面部和颈胸背的皮疹也消退殆尽。

出院后，患者严格遵医嘱服药并定期复查。一个多月后，他的各项化验指标都恢复了正常，药量也大幅度减少。如今，患者的皮疹完全消失，化验指标和肌力也都恢复了正常。治疗中激素类药物带来的发胖也逐渐消退，他只需要用小量的药物维持并保持定期复查即可。

回首这段康复之旅，患者深感自己无比幸运。他庆幸自己找对了医院、找对了医生。正是孔祥民和风湿病科医护人员的精湛医术和精心照料，让他得以重获健康。

山东省戴庄医院

获评“国家药物滥用监测工作表现突出基层报告单位”

本报济宁讯（通讯员 侯峰 周倩文）近日，2025年全国药品不良反应监测评价工作会议在昆明召开，对2024年药物滥用监测工作中表现突出的个人和基层报告单位进行了通报表彰。山东省戴庄医院荣获“2024年度药物滥用监测工作表现突出基层报告单位”称号。

药物滥用监测工作是药品监管工作的重要组成部分，是精神药品科学监管的有效数据支持，近年来，该院高度重视药品不良反应和药物滥用监测工作，在组织管理、制度建设、宣传培训、监测流程、数据上报和风险监控等方面开展积极探索实践。2024年，该院药学部共上报药物滥用监测报告196份，得到了上级部门的充分肯定。

该院将严格按照药品安全法律法规，继续做好药品不良反应、药物滥用监测工作，持续提高药物滥用监测水平，加强麻醉药品、精神药品监管，全力为群众用药安全和身体健康保驾护航。

济宁医学院附属医院

临床研究成果闪耀国际舞台

本报济宁讯（通讯员 高爽 张国荣）近日，第66届日本神经科学年会在日本大阪开幕，来自全球60余个国家和地区的逾8000名专家学者参会。在这场汇聚全球神经科学顶尖学者的学术会议上，济宁医学院附属医院神经内科王玉忠教授团队受邀作专题报告，并首次系统阐述了近红外光谱检测联合功能磁共振DTI成像技术在神经元核内包涵体病评估中的创新应用，这一重要研究成果引发国际学术界广泛关注。

该院神经内科研究团队通过整合近红外光谱技术、弥散张量成像（DTI）及临床表型数据，首次揭示了神经元核内包涵体病患者脑功能与结构的特征性改变模式。研究证实，这种多模态影像学评估方法能够精准反映患者认知功能衰退、运动障碍等核心临床症状的神经机制，为这一疑难疾病的早期无创诊断提供了可靠的新型评估手段。该成果不仅填补了神经元核内包涵体病客观评估方法学的空白，更为阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期诊断研究提供了重要参考。

王玉忠教授领衔的济宁医学院附属医院神经内科临床和基础研究团队长期致力于神经系统疾病的研究转化。此次会议，团队成员张国荣副主任医师、刘晨医师一同参加，团队还在会上展示了不对称性吉兰-巴雷综合征7例报道的壁报，介绍了不对称性吉兰-巴雷综合征的临床特征和可能的机制。这些研究成果的发布，标志着该院在神经系统疾病领域的临床研究水平已跻身国际先进行列。报告现场，有关专家学者就近红外光谱检测联合功能磁共振DTI成像技术评估脑结构和功能损害的临床应用前景展开深入讨论，并高度评价该研究为“神经元核内包涵体病的客观评估提供了里程碑式的解决方案”。

研究团队正在进一步优化这一评估体系，并计划开展多中心临床验证研究。这一创新性诊断方法的推广应用，有望为神经元核内包涵体病这一神经退行性疾病的早期诊断和治疗监测提供重要技术支撑。

医·前沿

汶上县人民医院

“生死救援”助宫外孕大出血患者转危为安

■通讯员 张焕栋 陈浩学

近日，汶上县人民医院妇科上演了一场惊心动魄的“生死救援”。在这场与死神的较量中，该院医护人员凭借精湛医术和高效协作，成功将一位宫外孕破裂大出血的患者从死亡线上拉了回来。

当日，腹痛剧烈的叶女士被紧急送入该院妇科。检查时，她面色苍白、四肢厥冷、腹部膨隆、呻吟不止。经快速检查，尿妊娠试验呈阳性，血压88/45mmHg，下腹压痛、反跳痛明显，B超显示腹腔大量积液。医生王秀娟迅速询问病史、完成查体，结合检查结果，判断叶女士为异位妊娠破裂合并失血性休克。

病情刻不容缓，医护团队立即完成生命体征监测，吸氧、双静脉通道建立、导尿管留置等术前操作。与此同时，与患者家属进行术前谈话并完成签字，为后续的抢救争取每一分每一秒。

手术中，医生们发现叶女士的盆腔内积有大量暗红色血块及血液，右侧输卵管壶腹部增大，破裂口仍在持续出血，可见妊娠病灶，并见输卵管出血向右侧腹膜波及，形成腹膜后大血肿。面对如此棘手的情况，凭借丰富经验与高超技术，医生们精准定位出血点并迅速止血，为患者争取了宝贵时间。

在手术过程中，患者出血量高达1500毫升。面对这一紧急情况，妇科团队迅速启动了紧急备血、快速输血、升压及改善微循环等一系列救治措施，全力以赴确保患者的生命安全。

经过紧张抢救，手术取得了圆满成功。患者被转入病房进行进一步观察和治疗。在医护人员的精心护理下，患者的病情逐渐恢复，生命体征趋于稳定。患者和家属对该院妇科医护人员表达了深深的感激之情。

宫外孕大出血来势凶猛，如不及时救治很可能有生命危险。在与死神抢生命的过程中，每一分每一秒都不容耽搁。此次成功救治，充分展现了汶上县人民医院妇科过硬的专业实力与高超的科学技术，彰显了医院在应对急危重症患者时的应急机制和团队协作能力。这不仅是医院多年来重视学科建设、人才培养与应急演练的成果体现，更为全县及周边地区的女性健康筑牢了一道坚实的生命防线。

广联医药

咱老百姓身边的放心药店